



GÜNCEL

YANIK

Yanma Sürecini Durdur

Termal Yanık: Musluk Suyu ile yıka, kurula
Toz Kimyasal Yanık: Sil, Süpür, Yıka, Kurula,
Sıvı Kimyasal: Yıka, Sil, Kurula

genel hasta yönetimi ve değerlendirmesi

Oksijen SPO2≥95 olacak şekilde maske ile ver

Solunum sıkıntısı varsa, havayolunu açık tut
İnhalasyon yanığı, boyunda sirküler yanık varsa erken entübasyonu düşün

Araya göz ped. ekle

Yanık bölgedeki giysiler çıkartılır. Deri veya doku kaldırılmamalı/soyulmamalıdır

Dokuzlar kuralını kullanarak yanığın boyutunu değerlendir

Yanık Yüzeyi
KURU Siteril Pansuman ile örtülür

% 10 dan fazla ise

% 10 dan az ise

(4 x kg x Yanık Yüzdesi) : 2
İlk 8 saatte verilecek sıvı hesabı
IV yoldan Ringer Laktad SKB 90
mmhg ustunde tut..

ŞOK-HİPOVOLEMİ Akış Şemasına Git

KKM

Ağrı kontrolü için MORFIN

0.1 mg/kg sulandırılarak IV (1 mg/dakika hızda) veya
0.1 mg/kg IM verilebilir (6 mg'ı aşmayacak şekilde)

(1 ampul morfin (10 mg), 9 cc SF ile 10 cc' e tamamlanır. Her cc' de 1 mg morfin elde edilir.